

Con la colaboración de:



EULAR
#EULAREVIEW18

ÁMSTERDAM JUNIO 2018

REVIEW

Annual European Congress
of Rheumatology

LO MEJOR DE
Artritis Reumatoide
Clínica

Dra. Cristina Bohórquez



Con la colaboración de:



EULAR
#EULAREVIEW18

ÁMSTERDAM JUNIO 2018

REVIEW

Annual European Congress
of Rheumatology

Temas congreso EULAR 2018
AR clínica





TEMAS

- Clínicos
- Riesgo cardiovascular
- Obesidad
- Imagen
- Tratamientos
- Aspectos psicosociales

- Biomarcadores:
 - Enfermedad con mal pronóstico

FRI0066

IMPACT OF SERUM ADIPOKINES IN EARLY STAGES OF RHEUMATOID ARTHRITIS

Los niveles elevados de leptina e IL-6, bajo adiponectina:

- mujeres, IMC>30
- Con daño radiológico.
- MDHAQ alto, RAPID3 elevado

- Factores predictores de remisión mantenida

FRI0036

SUSTAINED REMISSION RELATED FACTORS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS: IS IT POSSIBLE TO PREDICT SUSTAINED REMISSION?

- DAS28 y HAQ bajo al inicio
- anti-CCP+ fueron predictores de RS
- La presencia de ansiedad, depresión, astenia y FM fue menor en el grupo de RS, pero sin significación estadística

- Predicción de remisión tras suspensión del bDMARD

OP0038DOSE TAPERING AND DISCONTINUATION OF BIOLOGICAL THERAPY IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS IN REMISSION IN ROUTINE CARE –2-YEAR OUTCOMES AND IDENTIFICATION OF PREDICTORS

- Los factores predictivos:
 - <1 bDMARD previo
 - sexo masculino
 - bajo índice de inflamación por RMN
 - FR negativo
- 16% sin tratamiento biológico a los 2 años

bDMARD se redujeron:

- 2/3 de las dosis estándar de forma basal
- 1/2 después de 16 semanas
- Se suspendieron a las 32 semanas



RIESGO CARDIOVASCULAR

- Peso en morbimortalidad
- Destacar control estricto de LDL —Permite disminuir la aterosclerosis

THU0140

EFFECTS OF STATIN-TREATMENT ON CORONARY PLAQUES IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY JOINT DISEASES

- Se objetiva una progresión de la placa aterosclerótica en pacientes tratados
- En los pacientes en los que se ha conseguido el objetivo terapéutico de LDL se redujo la progresión de la aterosclerosis



RIESGO CARDIOVASCULAR

- Disminución de la inflamación de la pared vascular mediante PET-TAC

THU0143

VASCULAR WALL INFLAMMATION IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS DECREASES AFTER 6 MONTHS OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY WITH METHOTREXATE OR ADALIMUMAB AS MEASURED BY 18F-FDG-PET/CT

- MTX y del adalimumab producen disminución de la inflamación de la pared arterial
- Disminución del riesgo cardiovascular



OBSIDAD:

- Factor riesgo para desarrollar AR
- Factor mal pronóstico
- Impacto sobre los tratamientos

SP0072 DOES OBESITY INFLUENCE RA OUTCOMES ?

P. D. Kiely¹, ST GEORGES UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST, London, United Kingdom

- csDMARDS peor en obesos
- Anti TNF: Peor en obesos (sc como iv)
- Rituximab: No se ve afectado por el IMC
- Abatacept y Tocilizumab:
 - No se ve influida por la dosis sc fija vs la iv ajustada por peso
 - Menos impacto en la eficacia
- Baricitinib : valorar peor respuesta en pacientes >100Kg



IMAGEN

- Predecir la progresión radiológica

FRI0010

PREDICTION OF RADIOGRAPHIC PROGRESSION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS BY BOTH MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND ULTRASOUND

- La presencia de edema óseo por RMN así como PD> grado2 son importantes predictores de progresión radiológica en pacientes con AR activa
- Estos índices de imagen podrían ser más sensibles que los índices clínicos



TRATAMIENTOS

- Importancia del tratamiento precoz

THU0110

EARLY TREATMENT AND LOW DOSE CORTICOSTEROIDS MIGHT DECREASE MORTALITY IN EARLY ARTHRITIS: RESULTS FROM THE RECORD LINKAGE OF CLINICAL AND ADMINISTRATIVE DATABASES.

- En AR y AI el tratamiento precoz retrasa la mortalidad
- Dosis bajas de esteroides disminuyen la mortalidad



TRATAMIENTOS

- Vitamina D:
 - Mejora dolor
 - Niveles bajos se asocian con mayor actividad enfermedad

FRI0017

AN EXPLORATORY STUDY ON THE ROLE OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION IN IMPROVING PAIN AND DISEASE ACTIVITY IN RHEUMATOID ARTHRITIS

- La suplementación con vitamina D se asocia con mejoría del dolor y menor la actividad de la enfermedad en pacientes con/sin deficiencia de vitamina D.
- Altos niveles de vitamina D podrían tener efectos inmunomoduladores.



TRATAMIENTOS

- Reparación ósea

FRI0050

TOCILIZUMAB ACHIEVES BETTER REPAIR OF FOCAL BONE EROSIONS THAN TUMOR NECROSIS FACTOR INHIBITION IN RA PATIENTS - DATA FROM THE PROSPECTIVE REBONE STUDY ON EROSION REPAIR

- Tocilizumab demostró mayor eficacia que los anti-TNF en la reducción de las erosiones a las 52 semanas de tratamiento
- Los efectos sobre la inflamación fueron similares en ambos grupos



FACTORES PSICOSOCIALES

- Depresión/ansiedad
- Astenia e influencia de factores psicológicos en actividad de la enfermedad e incapacidad y
- El tratamiento mejora los outcomes en AR

OP0134

MULTIFACTORIAL EXPLANATORY MODEL OF FATIGUE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS: A PATH ANALYSIS

- Depresión e incapacidad tuvieron la mayor influencia sobre la astenia
- La actividad de la enfermedad y dolor sólo influyeron en la astenia a través de la incapacidad